

Foamex

Pakuotē
Iepakojums
Pakend

5l

LT

Silikoninė priemonė nuo putojimo, skirta užkirsti kelią putų formavimuisi arba susidariusioms putoms malšinti purkštuvu talpoje.

Ruošiant darbinį tirpalą su pesticidais ūkininkams kyla problemų dėl putojimo. Tai pailgina pildymo laiką, o pilant vandenį į purkštuvu talpą putas tiesiog gali išsiveržti ir užteršti aplinką.

PRIEŠ NAUDODAMI PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!

DĒMESIO!

Saugoti nuo vaiku. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052

SIEKIANT IŠVENGTI KELIAMOS RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

LV

Silikona līdzeklis pret putošanu – novērš putu veidošanos vai mazina miglotāja tvertnē esošās putas.

Ģatavojot darba šķīdumu ar pesticīdiem, lauksaimniekiem rodas problēmas, kas saistītas ar putošanu. Tas pagarina pildīšanas laiku, bet, iepildot ūdeni miglotāja tvertnē, putas var vienkārši izplūst ārā un piesārņot vidi. Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības.

Drošības prasības. S2 Sargāt no bērniem. S13 Neuzglabāt kopā ar pārliku, dzērieniem un dzīvnieku barību. S20 Lietošanas laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus (izmanto drošības datu lapas).

PERSONĀLĀ DROŠĪBA. Izmantojiet piemērotu aizsargapģērbu, cimdus, acu un sejas aizsargus. Līdzekļa izmantošanas laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet. Pēc darba, pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas nomazgājiet rokas un atsegtās ķermeņa daļas. Izvairieties no iekļūšanas acīs. Nieelpojiet tvaikus. Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – tālrunis 112.

EE

Vahutamisvastane silikoon, mõeldud vahu tekkimise vältimiseks või juba tekkinud vahu vähendamiseks pihustis.

Pestitsiidilahuse valmistamisel tekkib põllumeestel probleeme üleliigse vahuga. See pikendab valamisaega ning vett pihustisse valades võib vaht pihustist väljuda ja saastata keskkonda.

TÄHELEPANU! Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Kättemise ajal söömine, joimine ja suitsetamine keelatud. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Siuntos Nr. Žūrėti ant pakuočės. Pagaminimo data: žūrėti ant pakuočės
Galiojimo laikas 5 metai, jei bus saugomas saugojamas originalioje pakuočioje.

Ražošanas datums: skat. uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 5 gadi, ja tiks uzglabāts ražotāja oriģinālā iepakojumā.
Saadetise nr.: vt pakendilt. Tootmiskuupāev: vt pakendilt
Kasutuskölblük 5 aastat.

Gamintojas
Ražotājs
Valmistāja

UAB Nando
Universiteto g. 8A, Akademija, Kauno r. sav., Lietuva
Tel. / Faks. +370 37 441891
www.nando.lt; info@nando.lt

Kilmės šalis – EU
Izcelsmes valsts – EU
Pārticīgi – EU

LT NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Foamex galima maįšyti su visais šalyje registruotais pesticidais. Naudojimo norma: 5–10 ml į 100 l darbinio tirpalo. **Pastaba.** Prieš nuořiant miřinį būtina atidžiai perskaitykite pesticidų etiketę ir įsitikinti ar nėra apribojimų naudojant priedus.

TIRPALO RUOŐIMAS. Pripilkite pusę purkštuvo švaraus vandens. Supilkite rekomenduojamą mažiausią Foamex normą ir pesticidą.. Po to supilkite likusį vandens kiekį į gerai išmaįsykite. Jei tirpalas dar putoja, įpilkite didesnę Foamex normą.

PIRMŲJŲ PAGALBA. Jei pasijaučiate blogai, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šią etiketę. Patekus ant odos: reikia nedelsiant nusivilkti suteręsius drabužius, o odą nuplauti vandeniu ir muilu. Kreiptis į gydytoją. Patekus į akis: reikia plauti jas švari vandeniu mažiausiai 15 minučių ir nedelsiant kreiptis į akių gydytoją. Įkvėpus: nukentėjusį reikia išvesti į gryną orą. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Prarijus: be gydytojo leidimo nesukelkite vėmimo. Užtikrinkite nukentėjusiajam ramybę. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

TUŐIŲJŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS. Tuőią pakuotę išskalauti tris kartus, išplovus supilti į tirpalą ir išpurkšti. Tuőią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

LAIKYMAS. Produktą laikyti originalioje pakuotėje, gerai vėdinamoje patalpoje, nežemesnėje nei -10°C temperatūroje, vaikams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimo ir gyvulių pašaro, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI. Gamintojas garantuoja už produkto kokybę, jei jis gautas originaliame gamykliniame įpakavime, tinkamam laikomas ir naudojamas. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnų (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

LV LIETOŐANAS PAMĄCĪBA

Foamex var jaukt ar visiem valstī registrētajiem pesticīdiem.

LIETOŐANAS DEVAS: 5–10 ml / 100 l darba řķiduma

Piezīme. Pirms maisījuma pagatavošanas uzmanģi izlasiet pesticīdu etiķeti un pārlecinieties, vai nepastāv ierobežojumi piedevu izmantošanā.

ŐĶĪDUMA PAGATAVOŐANA. Piepildīt miglotāģu līdz pusei ar tīru ūdeni. Pievienot ieteikamo minimālo Foamex devu un pesticīdu. Pēc tam ieliet atlikušo ūdens daudzumu un rūģīgi samaiņt. Ja řķidums vēļ put, pievienot lielāģu Foamex devu.

PIRMĀ PALĪDZĪBA. Ja sajūtaties slikti, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību, uzrādot šo etiķeti. **Ja nokļūst uz ādas:** nekavējoties novilkt aptraipītās drēbes, ādu nomaģzāt ar ūdeni un ziepēm. Meklēt medicīnisko palīdzību. **Ja iekļūst acīs:** skalot ar tīru ūdeni vismaz 15 minūtes un nekavējoties meklēt acu ārsta palīdzību. **Ja ieelpots:** cietušais jāizved svaigā gaisā. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. **Ja norīts:** bez ārsta atļaujas neiņraist vemsānu. Nodrošināt cietušajam mieru. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. **Saindēšanās gadģjuma vērsties, Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67042473**

UZGLABĀŐANA. Produktu uzglabāt oriģinālā iepakojumā, labi vēdināmās telpās, ne zemākā kā -10°C temperatūrā, bērniem nepieejamās vietās, atsevišķi no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības, tālu no elektrības un siltuma avotiem.

IZLIETOTO IPAKOJUMU LIKVIDEŐANA. Izlietoto iepakojumu trīs reizes izskalot, izskaloto řķidrumu ieliet atpakaļ řķīdumā un izsmidzināt. Izlietoto iepakojumu un produkta pārpalikumu likvidēt saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām. Neizmantoj iepakojumu citiem mērķiem. **GARANTĪJAS NOSĀCĪJUMI.** Ražotājs garantē produkta kvalitāti, ja tas saņemts ražotāja oriģinālā iepakojumā, ticis atbilstoši uzglabāts un izmantots. Ražotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies tādu faktoru dēļ (piem., ārkārtas vides apstāģji), kurus tas nespeģ kontrolēt. Visi produkta lietošanas ieteikumi snieģti, pamatoģoties uz ražotāja pašreģģju pieredzi.

EE KASUTUSSOOVITUSED

Foamex võib segada kõikide riigis registreeritud pestitsiididega. Kasutusnormid: 5–10 ml 100 l-sse valmislahusesse.

Mārkus. Enne segu valmistamist lugege pestitsiidit etikett kindlasti tähelepanelikult läbi ja veenduge, et lisainetead kasutamisel ei ole piiranguid.

LAHUSE VALMISTAMINE. Täitke pool pihustit puhta veega. Lisage väikseim soovitatav kogus vahendit Foamex ja pestitsiid. Pärast seda lisage ülejäänud vesi ja segage hästi. Kui lahuse siiski vahutab, lisage suurem kogus vahendit Foamex.

TÜHJA PAKENDI KÕRVALDAMINE. Tühi pakend loputada kolm korda, loputusvesi valada lahusesse ja kasutada pihustamisel. Tühi pakend ja toote jäätmel tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Mitte kasutada pakendit muld otstarbel.

HOUSTAMINE. Toodet hoida originaalpakendis hästi õhutatavas ruumis temperatuuril –10 °C. Hoida lastele kättesaamatus kohas, eemal toidust, joogist ja loomasöödadest, samuti elektrij- ja soojusallikatest.

GARANTIIŅUDEED. Tootja tagab toote kvaliteedi garantii, kui toode on saadud tehase originaalpakendis ning seda hoitakse ja kasutatakse õigesti. Tootja ei vastuta kontrollimatute tegurite (nt äärmuslike keskkonningimuste) tõttu tekkinud kahju eest.