

# Prestop®

## Juurehaiguste tõrjeks maasikal

Prestop® on bioloogiline taimekaitsevahend, mis sisaldab Soome põllumullast isoleeritud *Gliocladium catenulatum* J1446 seent. Toode tõrjub efektiivselt erinevaid seenhaiguseid nii juurtel kui ka lehtedel. Maasika juurepatogeeneid (*Phytophthora*, *Fusarium*, *Pythium*) vähendavad taime kasvu jõudu ja saagivõimet ning põhjustavad närbumist ja taime surma. Juurehaiguste poolt põhjustatud probleeme on võimalik ennetada, töödeldes maasikataimi Prestop'iga juba istutamise ajal. Prestop muudab juuresüsteemi tugevamaks ja tervemaks, parandab taime talvitumist ja aitab taimedel toota varasemat ja suuremat saaki. Prestop sobib kasutamiseks integreeritud taimekaitses ja mahetaimekasvatases.



### Töodelge maasikataimi istutamise ajal ja korrake töötlemist 1 kuu pärast istutamist:

**Sissekastmine:** hoidke maasikataimi 0,5 % Prestop'i lahuses, kuni juured on ühtlaselt märjad (1-3 minutit). Kasutage keskmiselt 400 liitrit 0,5 %-list suspensiooni 30 000 - 40 000 taime sissekastmiseks.

**Kassetitaime leotamine:** leotage enne istutamist 0,5 % Prestop'i veesuspensioonis 25 L/1000 taime kohta (125 g/1000 taime kohta).

**Tilkkastmine/kastmine/rea pritsimine:** kasutage kulunormi 200 - 250 g/1000 taime kohta (0,5 % Prestop lahuse 40-50 liitrit/1000 taime kohta). Vee kogus võib erineda vastavalt töötlemise meetodile.

**0,5% Prestop'i suspensiooni valmistamine:** 1 kg Prestop'i/200 liitri vee kohta. Kõigepealt segage Prestop vähese koguse külma veega (1 kg /10-20 liitrit). Laske suspensioonil seista 15-30 minutit. Segage hoolikalt kuni suspensioon on ühtlane ning lahjendage lõpliku mahuni.


*Prestop on saadaval 100 g ja 1 kg suurustes pakendites. Avamata pakendis, hoiustatuna jahedas kohas +8°C juures või alla selle, säilib toode elujõulisena 12 kuud.*



Prestop'i kasutati istutamisaegseks sissekastmiseks ja u 1 kuu pärast istutamist kastmisel 250 g/1000 taime kohta.

Töötlemata kontroll

Surnud taime osakaal (%)  
(sort Polka)



Prestop'iga töötlemised eelmisel kasvuhooajal (sissekastmine istutamise ajal + kastmine) vähendasid taime hukkumist talvel nii tunnelis kui ka avamaal.